

# *КВАНТОВА ИНФОРМАТИКА*

Николай М. Николов

Лекция 1 / 10.10.2022, версия 0

Започваме с **увод**, който не е необходима логическа част от изложението на този курс от лекции.

Ще представим някои ключови физически експерименти, които са придружени от кратки сведения за използваните в тях физически явления.

В курса обаче няма да се предполагат, нито да се въвеждат никакви понятия и знания от физиката, собственно за излагането на квантовата информатика.

**Необходимата начална подготовка** включва единствено базисни знания от линейната алгебра (и аналитична геометрия).

В изложението се използва и началната теория на вероятностите, която се отнася до крайни вероятностни разпределения и е предмет на изучаване още в училищното образование.

Теоретична  
квантова  
физика

Експериментална  
и инженерна  
квантова  
физика

Алгебра

Компютърни  
науки

Вероятности  
и статистика



Математическа логика  
и теория на алгоритмите

## УВОД

Квантови свойства, квантови събития, квантови множества

В класическата физика (физиката до XX век) всяка физична система се описва с множество:

*множество на (елементарните) състояния на системата  $\Omega$ .*

Различните свойства на системата съответстват на подмножества  $A \subseteq \Omega$ :

Така, свойство = (под)множество

и те са синонимни изрази в този контекст.

## УВОД

Квантови свойства, квантови събития, квантови множества

---

Различните свойства на системата съответстват на подмножества  $A \subseteq \Omega$ :

Така, свойство = (под)множество

и те са синонимни изрази в този контекст.


В контекста на теория на вероятностите множеството  $\Omega$  се нарича също *множество на елементарните събития*, а подмножествата  $A \subseteq \Omega$  се наричат *събития*.

И така, ние ще използваме като синоими “събитие” = “(под)множество” (= “свойство”).

## УВОД

## Квантови свойства, квантови събития, квантови множества


Различните свойства на системата съответстват на подмножества  $A \subseteq \Omega$ :



Множество на елементарните събития  $\Omega$  и отделяне на свойство “ $A$ ”, като подмножество на  $\Omega$ .

## УВОД

## Квантови свойства, квантови събития, квантови множества



Множество на елементарните събития  $\Omega$  и отделяне на свойство “ $A$ ”, като подмножество на  $\Omega$ .

Свойствата могат да се комбинират чрез логическите връзки “*и*” и “*или*”, които на езика на подмножествата отговарят на операциите *сечение*  $\cap$  и *обединение*  $\cup$ :

$$A \text{ и } B \longleftrightarrow A \cap B,$$

$$A \text{ или } B \longleftrightarrow A \cup B.$$

## УВОД

---

### Квантов феномен 1: некомутативност на наблюденията

В класическата физика и статистика, в едно множество  $\Omega$  можем да отделим последователно две събития  $A, B \subseteq \Omega$  (т.е. подмножества, свойства) по два равносилни начина:

$$(1) \quad \Omega \rightsquigarrow A \rightsquigarrow A \text{ и } B,$$

$$(2) \quad \Omega \rightsquigarrow B \rightsquigarrow B \text{ и } A.$$

## УВОД

## Квантов феномен 1: некомутативност на наблюденията

Количествена илюстрация на класическата еквивалентност –

ако означим:  $N(\Omega) :=$  брой на елементи на  $\Omega$

$N(A) :=$  брой на елементи на  $A$

$N(A \text{ и } B) :=$  брой на елементи на  $A \text{ и } B$

то тъждеството:

$$\underbrace{\frac{N(A \text{ и } B)}{N(\Omega)}}_{\substack{\text{относителен} \\ \text{дял на } A \text{ и } B \\ \text{в } \Omega}} = \underbrace{\frac{N(A)}{N(\Omega)}}_{\substack{\text{относителен} \\ \text{дял на } A \\ \text{в } \Omega}} \cdot \underbrace{\frac{N(A \text{ и } B)}{N(A)}}_{\substack{\text{относителен} \\ \text{дял на } B \\ \text{в } A}}$$

## УВОД

## Квантов феномен 1: некомутативност на наблюденията

Количествена илюстрация на класическата еквивалентност

ако означим:

$$N(\Omega) := \text{брой на елементи на } \Omega$$

$$N(A) := \text{брой на елементи на } A$$

$$N(A \text{ и } B) := \text{брой на елементи на } A \text{ и } B$$

то тъждеството:

$$\underbrace{\frac{N(A \text{ и } B)}{N(\Omega)}}_{\substack{\text{относителен} \\ \text{дял на } A \text{ и } B \\ \text{в } \Omega}} = \underbrace{\frac{N(A)}{N(\Omega)}}_{\substack{\text{относителен} \\ \text{дял на } A \\ \text{в } \Omega}} \cdot \underbrace{\frac{N(A \text{ и } B)}{N(A)}}_{\substack{\text{относителен} \\ \text{дял на } B \\ \text{в } A}}$$

съответства на

вероятностния закон:

$$\underbrace{p(A \text{ и } B)}_{\substack{\text{вероятност} \\ \text{за } A \text{ и } B}} = \underbrace{p(A)}_{\substack{\text{вероятност} \\ \text{за } A}} \cdot \underbrace{p(B|A)}_{\substack{\text{условна} \\ \text{вероятност} \\ \text{за } B \text{ при} \\ \text{условие } A}}$$

(което е въщност е определението за *условна вероятност*).

## УВОД

Квантов феномен 1: некомутативност на наблюденията

---

Тогава, равенството

$$N(A \text{ и } B) = N(B \text{ и } A)$$

се изразява във вероятностния закон

$$p(A) \cdot p(B|A) = p(B) \cdot p(A|B),$$

който се нарича *закон на Бейс* (Bayes' law / theorem).

Той се нарушава в квантовата физика (и статистиката) и условната вероятност става първичен обект.


## УВОД

## Квантов феномен 1: некомутативност на наблюденията

Илюстрация на това нарушение дава така неречения:

## Експеримент с кръстосани поляризатори<sup>1</sup>

Извършва се с *фотони* - частици “пренасящи” светлината.




Състоянието на един фотон се описва от една наредена тройка (посока на движение, енергия, вътрешно състояние). Вътрешното състояние на фотона съответства на така наречената *поляризация* на фотона.

---

<sup>1</sup>crossed polarizer experiment

## Експеримент с кръстосани поляризатори

Извършва се с фотони - частици “пренасящи” светлината.




Състоянието на един фотон се описва от една наредена тройка (посока на движение, енергия, вътрешно състояние). Вътрешното състояние на фотона съответства на така наречената **поляризация** на фотона.

Поляризационните състояния са същите, като състоянията на най-простата квантова система наречена “**квантов бит**”. В описания експеримент се използват само фотони със специален тип вътрешни състояния: те се наричат линейни поляризации. Състояние на **линейна поляризация** се характеризира с ос, която е перпендикулярна на посоката на движение на фотона.

## Експеримент с кръстосани поляризатори

Извършва се с *фотони* – частици “пренасящи” светлината.




Така, ако група фотони се разпространяват в една и съща посока, то от тях може да бъде отделено подмножество, които имат еднаква “линейна поляризация” – вид “свойство”.


Отделянето на фотони с фиксирана линейна поляризация се извършва чрез филтри, наречени *поляризатори*.

## Експеримент с кръстосани поляризатори

Експериментът започва със селекция на фотони с фиксирана поляризация:



## Експеримент с кръстосани поляризатори



Ако сега поставим втори поляризатор след първия, който е идентичен, тогава всички фотони, които са преминали през първия, ще преминат и през втория.

Фотони ще продължават да преминават дори и ако завъртим оста на поляризация на втория поляризатор на ъгъл  $\alpha$  спрямо първия.


Преминава обаче само част  $\cos^2 \alpha$  ( $\in [0, 1]$ ) от фотоните.

## УВОД

## Квантов феномен 1: некомутативност на наблюденията

# Експеримент с кръстосани поляризатори

результат от теорията и експеримента



Важно е да се отбележи, че ние може да пускаме фотоните един по един и в този случай един фотон преминава или напълно не преминава през всеки поляризатор.

Числото  $\cos^2 \alpha$  в този случай представлява вероятността за преминаване на фотон през втория поляризатор след, като е бил пропуснат от първия.

## УВОД

## *Експеримент с кръстосани поляризатори*

Нека сега допълним опита и с трети поляризатор:

Статистика на преминалите фотони през два последователни поляризатора след първоначалната селекция

нелият брой преминали фотони

$$N \cdot \cos^2 \alpha \cdot \cos^2(\alpha - \beta)$$

отделните вероятности на преходи

## Експеримент с кръстосани поляризатори


Ако сравним резултатите при размяната  $\alpha \leftrightarrow \beta$ , то ще получим:

$$\begin{aligned} & N \cdot \cos^2 \alpha \cdot \cos^2(\alpha - \beta) \\ & \stackrel{?}{=} N \cdot \cos^2 \beta \cdot \cos^2(\beta - \alpha). \end{aligned}$$

Следователно е разлика възможна, например при  $\alpha = 45^\circ$  и  $\beta = 90^\circ$ :

$$\underbrace{N("A \text{ и } B")}_{N \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} \neq \underbrace{N("B \text{ и } A")}_{N \cdot 0 \cdot \frac{1}{2}}.$$


## Експеримент с кръстосани поляризатори



В разгледания експеримент, свойството (събитието)  $A$  отговаря на поляризация под ъгъл  $\alpha$  ( $E_\alpha$ ), а  $B$  на поляризация под ъгъл  $\beta$ .

В частност виждаме, че поляризациите под ъгъл  $0^\circ$  и  $90^\circ$  отговарят на взаимно изключващи се събития (свойства), но ако между тях стои поляризатор  $E_{45^\circ}$  под ъгъл  $45^\circ$ , то прехода между  $E_{0^\circ}$  и  $E_{90^\circ}$  става възможен!

## Експеримент с кръстосани поляризатори



Нека обърнем внимание, че в някои от формулите по-горе сме поставили в кавички “*A и B*”, понеже броя нито в лявата страна, нито в дясната има смисъл на брой на обектите със свойство *A и B*.

В квантовата логика, която ще споменем след малко, се оказва, че логическите операции остават комутативни и в горния експеримент събитието *A и B* се оказва нулевото събитие (т.е., празното или още, невъзможното събитие).

## УВОД

Квантов феномен 1: некомутативност на наблюденията

---

По определение, две квантови събития  $A$  и  $B$ , за които винаги е изпълнен закона на Бейс

$$p(A) p(B \mid A) = p(B) p(A \mid B)$$


се наричат *взаимно комутиращи* или също *съвместно проверяеми* (*съвместно измерими*).

По такъв начин, квантовата теория допуска, че има събития които **не могат** съвместно да се проверяват (измерват) – това именно наблюдаваме в представения по-горе квантов феномен 1.

## УВОД

## Квантов феномен 1: некомутативност на наблюденията

Физическото обяснение на квантовия феномен 1 е, че всяко наблюдение и измерване в природата е активен процес.



То е свързано с неотстранимо смущение върху наблюдавания обект и това смущение има минимален праг, който се нарича “елементарна порция / квант (quantum) на действието”.

## УВОД

---

### Квантово-логическите операции и тяхната недистрибутивност

Квантовите свойства, както и класическите свойства се намират в отношение (релация) на *мажориране*:

това изразяваме с израза “*свойство A влече свойство B.*

На езика на множествата:

$$A \subseteq B$$

(*A* е подмножество /включва се/ в *B*).


## УВОД

## Квантово-логическите операции и тяхната недистрибутивност

Това води до т.нар. **квантово-логически подход** към обосноваването (аксиоматизацията) на квантовата теория.

В основата му стои предположението, че множеството на квантовите събития е **частично наредено множество**.

Това поражда по-нататък  
логически операции



## УВОД

Квантово-логическите операции и тяхната недистрибутивност

---

Логическите операции при тази конструкция остават винаги комутативни:

$$A \text{ и } B = B \text{ и } A, \quad A \text{ или } B = B \text{ или } A.$$

При квантовите системи обаче условната вероятност:

$$p(B | A) \neq \frac{p(A \text{ и } B)}{p(A)},$$

тъй като в противен случай, както видяхме, няма да се нарушава закона на Бейс. Зашо?

## УВОД

Квантово-логическите операции и тяхната недистрибутивност

---

Условните вероятности, както и пълните вероятности трябва да изпълняват *адитивния закон*:

$$p((A \text{ или } B) | C) = p(A | C) + p(B | C), \quad (*)$$

$$p(A \text{ или } B) = p(A) + p(B), \quad (**)$$

ако  $A \text{ и } B = \emptyset$  – празното (невъзможното) събитие.

От закона на Бейс би следвало  $(**) \implies (*)$ , ако е в сила

$$(A \text{ или } B) \text{ и } C = (A \text{ и } C) \text{ или } (B \text{ и } C) \quad (\text{дистрибутивност})$$

## УВОД

Квантово-логическите операции и тяхната недистрибутивност

---

В квантови системи дистрибутивните закони се нарушават:

имаме,  $(A \text{ или } B) \text{ и } C \neq (A \text{ и } C) \text{ или } (B \text{ и } C)$ ,


$(A \text{ и } B) \text{ или } C \neq (A \text{ или } C) \text{ и } (B \text{ или } C)$ .

Това следва от:

Квантов феномен 2: интерференция на вероятността

## Експеримент с двоен процес<sup>2</sup>


Опитната постановка  
в реалистичен вид




---

<sup>2</sup>double-slit experiment


## Експеримент с двоен процеп





Случай (1): изследва се общото количество на преминалите частици:

- (1<sub>A</sub>) отворен е само процеп  $A$ , при което определяме  $N(A)$ ;
- (1<sub>B</sub>) отворен е само процеп  $B$ , при което определяме  $N(B)$ ;
- (1<sub>A или B</sub>) отворени са  $A$  и  $B$ , т.е. всяка частица преминава през  $A$  или  $B$  и следователно, така определяме  $N(A \text{ или } B)$ .



Случай (1): изследва се общото количество на преминалите частици.

Резултат:

$$\begin{aligned} & N(A \text{ или } B) \\ & = N(A) + N(B). \end{aligned}$$


Случай (2): зад процепите е поставен малък экран (детектор)  $C$ :

(2<sub>A</sub>) отворен е само процеп  $A$ . В  $C$  се регистрират  $N(A \text{ и } C)$  на брой частици.

(2<sub>B</sub>) отворен е само процеп  $B$ . В  $C$  се регистрират  $N(B \text{ и } C)$  на брой частици.


(2<sub>A или B</sub>) отворени са  $A$  и  $B$ .

В  $C$  се регистрират  $N((A \text{ или } B) \text{ и } C)$  на брой частици.




Случай (2): зад процепите е поставен малък экран (детектор)  $C$ :

Резултат:



Случай (2): зад процепите е поставен малък экран (детектор)  $C$ :


Резултат:




## УВОД

## Квантов феномен 2: интерференция на вероятността

## Експеримент с двоен процеп




Първи опит за интерпретация: имаме работа не с частици, а с вълни, и наблюдаваме явлението **интерференция**



## УВОД


## Квантов феномен 2: интерференция на вероятността

## Експеримент с двоен процеп




Първи опит за интерпретация: имаме работа не с частици, а с вълни, и наблюдаваме явлението **интерференция**

Опровергава се от:



## Експеримент с двоен процеп



И така, констатирахме, че за една частица да премине през  $A$  и да попадне в  $C$  или да премине през  $B$  и да попадне в  $C$  не е същото, като да премине без проследяване през  $A$  или  $B$  и да попадне в  $C$ .

## УВОД

## Квантов феномен 2: интерференция на вероятността

## Експеримент с двоен процеп



Констатирахме нарушение на дистрибутивността при квантовите събития:

$$(A \cap C) \cup (B \cap C) \neq (A \cap B) \cup C,$$

$$(A \cup C) \cap (B \cup C) \neq (A \cup B) \cap C,$$

спрямо логическите операции произтичащи от подредба им.

УВОД

---

## Амплитуди вместо вероятности

Експериментът по-горе в малко по-абстрактен вариант:


преход на система между две състояния,

начално “i” (initial) и крайно “f” (final), през

две алтернативни междинни състояния: “1” и “2”.

Два канала за преход:

$i \rightarrow 1 \rightarrow f$  и  $i \rightarrow 2 \rightarrow f$ :




## УВОД

## Амплитуди вместо вероятности

Два канала за преход:

$i \rightarrow 1 \rightarrow f$  и  $i \rightarrow 2 \rightarrow f$ :



В класическата статистика, ако вероятностите за преходи  $i \rightarrow 1$ ,  $i \rightarrow 2$ ,  $1 \rightarrow f$  и  $2 \rightarrow f$  са  $p_{i,1}$ ,  $p_{i,2}$ ,  $p_{1,f}$  и  $p_{2,f}$ , съответно, то прехода  $i \rightarrow f$  се извършва с вероятност

$$p_{i,f} = p_{i,1} p_{1,f} + p_{i,2} p_{2,f}$$


В този случай обаче не се наблюдава “интерференцията” (т.е., погасяването) на вероятността от експеримента по-горе.

## УВОД

## Амплитуди вместо вероятности

Два канала за преход:

$i \rightarrow 1 \rightarrow f$  и  $i \rightarrow 2 \rightarrow f$ :



Оказва се, че в квантовата статистика, заедно с вероятностите за преход  $p_{i,1}$ ,  $p_{i,2}$ ,  $p_{1,f}$  и  $p_{2,f}$ , са определени и *комpleксни числа*  $a_{i,1}$ ,  $a_{i,2}$ ,  $a_{1,f}$  и  $a_{2,f}$ , за които

$$a_{i,f} = a_{i,1} a_{1,f} + a_{i,2} a_{2,f}$$

които са свързани с отношенията


$$\begin{aligned} p_{i,1} &= |a_{i,1}|^2, & p_{i,2} &= |a_{i,2}|^2, \\ p_{1,f} &= |a_{1,f}|^2, & p_{2,f} &= |a_{2,f}|^2, & p_{i,f} &= |a_{i,f}|^2. \end{aligned}$$

Наричат се: *амплитуди на вероятността*.

## УВОД

## Амплитуди вместо вероятности

В по-обща ситуация, прехода  $i \rightarrow f$  може се извърши през  $n$  алтернативни междинни състояния на  $k$  брой стъпки:



В определени условия, наречени във физиката “класическа граница” амплитудите на повечето пътища се погасяват взаимно и остава един доминиращ път – оцветения с плътна оранжева линия – това е “класическата траектория” на системата.

## УВОД

---

Други теми от курса:

- Квантови изчисления.
- Квантова логика и квантови категории.
- Неотстраним индетерминизъм на наблюденията върху квантовите системи.
- Квантово сплитане и неговите приложения.

Теоретична  
квантова  
физика

Експериментална  
и инженерна  
квантова  
физика

Алгебра

Компютърни  
науки

Вероятности  
и статистика



Квантова  
информатика

Математическа логика  
и теория на алгоритмите